

外籍學生、僑生及大陸港澳地區學生健康檢查參考事項(核定版)

中華民國 104 年 6 月 3 日衛生福利部部授疾字第 1042100184 號函

一、目的：

衛生福利部為防杜境外移入麻疹、德國麻疹病例，及加強校園結核病防治，特訂定此參考事項，作為教育部指導相關學校實施外籍學生、僑生及大陸港澳地區學生健康檢查之參考。

二、法源依據：

(一) 短期研修生停留健檢：

1. 學校衛生法第 8 條，學校應建立學生健康管理制，定期辦理學生健康檢查。
2. 學校衛生法施行細則第 6 條，本法第 8 條第 1 項所定學生健康檢查管理制度，包括下列事項(節錄)：學生健康檢查、學生健康資料管理及應用、其他各級主管機關規定之事項等。
3. 傳染病防治法第 36 條，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施。

(二) 居留健檢：

1. 入出國及移民法第 11 條及第 24 條
2. 外國人停留居留及永久居留辦法第 11 條
3. 大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法第 10 條

三、短期研修生停留健檢：(新增作法)

(一) 實施對象：以停留身分來臺之大陸港澳研修生、外籍交換生(不包括華語文生)且來臺研習時間超過 3 個月以上者。

(二) 停留健康檢查項目：

1. 麻疹、德國麻疹疫苗接種證明或抗體陽性報告
(學生已於當地接種疫苗者，請攜帶預防接種證明來臺，可免再次接種。此證明無效期限限制，但接種年齡必須大於 1 歲。)
2. 胸部 X 光攝影檢查肺結核(入國後 14 日內辦理)。

(三)作法：

1. 請學校於招生文件提醒學生，已於當地接種麻疹、德國麻疹疫苗者，請攜帶預防接種證明來臺，於入學報到時繳交，可免再次接種。若學生入學報到時未繳交預防接種證明，則於入國後 14 日內至外國人健康檢查指定醫院補辦理或併入新生健康檢查辦理。
2. 學生入國後 14 日內，由學校安排至外國人健康檢查指定醫院進行胸部 X 光攝影檢查肺結核，或併入新生健康檢查辦理。

(四)報告格式：

短期研修健康檢查表(丙表)之參考樣張如附件。學生亦可分別檢具預防接種證明及胸部 X 光攝影檢查報告。

(五)實施日期：自 104 年 9 月 1 日起來臺停留 3 個月以上之大陸、港澳研修生、外籍交換生(不包括華語文生)。

四、居留健檢：(既有作法)

- (一)來臺修讀學位之外籍生、僑生(含港澳)及大陸學生以及海青班學生，於申請居留簽證、居留證或換發多次入出境許可證時，須檢具外籍人士辦理居留之健康檢查證明應檢查項目表(乙表)。
- (二)居留健康檢查項目：胸部 X 光攝影檢查肺結核、腸內寄生蟲糞便檢查、梅毒血清檢查、麻疹德國麻疹接種證明或抗體陽性報告及漢生病檢查。來自特定地區者，得免驗腸內寄生蟲及漢生病檢查。
- (三)居留健康檢查證明應檢查項目表(乙表)參考格式，請至衛生福利部疾病管制署網頁查詢，網址：www.cdc.gov.tw/點選國際旅遊與健康/外國人健檢/居留健檢。

附錄：短期研修生健康檢查問答集

Q1：為何要求短期研修生檢具麻疹、德國麻疹疫苗接種證明或抗體陽性報告？

A：

1. 麻疹、德國麻疹的傳染力極強，可經由空氣、飛沫、或病人鼻咽黏液接觸而感染，由於鄰近中國大陸、東南亞，以及部分國家的疫情仍然嚴重，病毒可能經由經商、遊學、探親、觀光等方式進入國內，特別是在學校容易造成傳播與聚集。而孕婦感染德國麻疹，病毒可以透過胎盤垂直傳染給胎兒，可能造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損。
2. 民國 97 年曾發生 2 起校園德國麻疹群聚事件，各有 1 名僑生於僑居地感染德國麻疹，來臺後發病，分別導致同校 7 名及 8 名僑生感染德國麻疹。
3. 接種 1 劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)有 95%-100%可產生保護力，是預防麻疹、德國麻疹最有效的方法。接種 MMR 疫苗後除了可能會有一般疫苗常見的紅、腫、痛等局部反應外，發生嚴重不良反應的機率極低。

Q2：為何要求短期研修生進行胸部 X 光攝影檢查肺結核？

A：

1. 結核病為空氣/飛沫傳播疾病，與結核病個案一同修課的人員，將長期暴露於感染風險。我國曾經發現某名罹患多重抗藥結核病的外籍學生，在校園內接觸百餘名學生。
2. 短期研修生來臺後 14 日內進行胸部 X 光攝影檢查，可及早發現結核病個案，阻斷疾病傳播，保護校園師生健康。

Q3：短期研修生如未辦理健康檢查，該如何處理？

A：建議比照新生健康檢查的作法，通知學生補辦理。

Q4：短期研修生健康檢查如有不合格項目者，該如何處理？

A：

1. 有關麻疹、德國麻疹預防接種：

- (1) 學生未檢具麻疹、德國麻疹預防接種證明者，可以不檢驗抗體，直接自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR 疫苗)。但經醫師評估有接種禁忌者，得免接種。
- (2) 麻疹、德國麻疹抗體檢查結果為陰性或未確定者，須自費接種 MMR 疫苗。但經醫師評估有接種禁忌者，得免接種。
- (3) MMR 疫苗接種禁忌，包括：
 - ◇ 已知對「蛋」之蛋白質或疫苗的成份有嚴重過敏者，不予接種。
 - ◇ 孕婦。
 - ◇ 已知患有嚴重免疫缺失者（包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者）。

2. 有關胸部 X 光攝影檢查肺結核：

- (1) 對於疑似肺結核個案，請學校安排學生至醫院胸腔科門診檢查，檢查項目可能包括：胸部 X 光攝影及痰液檢查，必要時進行電腦斷層掃描等。檢查醫院可參考疾病管制署網頁公布之「胸部 X 光檢查確認機構名單」，網址：www.cdc.gov.tw>國際旅遊與健康>外國人健檢>健檢指定醫院。
- (2) 對於確診肺結核個案，除多重抗藥性個案外，可以自費接受治療。地方衛生單位將治療個案納入管理，必要時提供都治服務，指派關懷員送藥，並親眼目睹病患服藥，以協助個案完成 6~9 個月的抗結核藥物治療。
- (3) 結核病個案於接受治療後，方經由痰液培養檢出多重抗藥性結核菌者，經初步治療，於痰液檢查陰轉後，將請其返回母國繼續治療。